# JAKO-40

*Jabón potásico* 40% p/v sales potásicas de ácidos grasos vegetales. Procede de la saponificación de aceites y grasas de origen natural.

Disuelve el exoesqueleto de quitina de insectos de caparazón blando como pulgones, cochinillas, mosca blanca, ácaros, etc.

El tratamiento con **JAKO-40** es totalmente no tóxico, no existe posibilidad de intoxicación ni para las personas que lo aplican, ni para los seres que puedan comer cualquier fruta, hortaliza o planta tratada, no produce residuos tóxicos. No provoca ningún cambio biológico ni en el aspecto ni en la forma de los frutos.

**JAKO-40** no influye negativamente en el suelo, aire o aguas subterráneas, plantas o animales ya que por su naturaleza, no daña al medio ambiente y se descompone rápidamente convirtiéndose en carbonatos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contenido Garantizado:

| | |
|---|---|
| Sales Potásicas de Ácidos Grasos (Oleato Potásico) | 40% p/v |
| Diluyentes | 60% p/v |

• Envase: 1, 5 Y 20 LIT

## DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

Se aconseja tratar en horas de mínima insolación para evitar cualquier riesgo de fitotoxicidades. Los mejores resultados se obtienen cuando se utilizan aguas blandas. En aguas duras añadir 1 kg de sulfato amónico por cada 1000 l de agua, antes de añadir el producto.

| CULTIVO | OBJETIVO | DOSIS |
|---|---|---|
| Frutales (cítricos) | Fumagina, melaza | 1%-1,5% |
| Flores | Hongos, impurezas, polvos | 0,6%-0,8% |
| Mojante | Adyuvante en aplicación foliar | 0,30% |

Aplicación como humectante: 100-150 ml/hl, como potenciador: 400-600 ml/hl y como limpiador: 800-1.000 ml/hl. Para cualquier tipo de mezcla realizar prueba de compatibilidad, en caso de duda contacte con la casa comercial. No mezclar con productos de reacción ácida. No exponer a la luz ni a fuentes de calor. No aplicar a dosis altas en momentos de alta insolación
.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluido en la lista del Reglamento C.E. 1488/97, anexo II, parte B, por lo que está permitido su uso en agricultura ecológica, teniendo además un gran campo de aplicación en agricultura integrada

## COMPATIBILIDAD

- Es compatible con fungicidas, insecticidas, y abonos foliares en general. - Es incompatible con surfactantes aniónicos. - No recomendable mezclar con soluciones de pH < 7 o compuestos catiónicos ni con azufre. - No poner en contacto con luz ultravioleta ni con temperaturas superiores a 38 ºC.