

Ficha técnica FELTISUR

(Steinernema feltiae)

Nematodos entomopatógenos para combatir eficazmente las larvas de varias especies de dípteros, como las moscas esciáridas, y las pupas y larvas de trips en los sustratos.

Una vez aplicados, éstos buscan activamente las larvas y pupas, penetran en su interior a través de sus aberturas naturales, como boca, ano, espiráculos, etc. Cuando ya están dentro, el nematodo les provoca la muerte por septicemia de forma rápida. En el interior del insecto muerto, los nematodos se reproducen y alimentan hasta consumirlo en su totalidad. Cuando esto ocurre, los nematodos vuelven a salir fuera del insecto para volver a infectar a otras larvas y pupas. Es importante que FELTISUR se aplique directamente al suelo o sustratos húmedos y que la penetración de los nematodos el suelo no se vea afectada por ningún tipo de acolchado.

	DOSIS	M 2 de CULTIVO / unidad	CANTIDAD DE AGUA A APORTAR
1 FELTISUR 50 M	0,5 millones nematodos / m2	100 M2	Volumen necesario para que se quede bien mojado todo el sustrato (1-2 litros/m2 aprox.)
FELITISUR 500 M		1.000 M2	

Si es necesario, repetir los tratamientos cada 7-15 días

- Método rápido y EFICAZ.
- Fácil aplicación.
- Sin problemas de resistencias.
- Buena persistencia en el suelo..
- Seguro para el aplicador y el medio ambiente.



Ficha técnica FELTISUR (Steinernema feltiae)

- Se puede utilizar con cualquier sistema de riego , pulverizadores de mochila o motorizados, etc.
- Hacer una dilución previa, diluyendo el contenido del envase en un cubo con 5 litros de agua (15-20°C) y remover bien.
- Verter la dilución en el tanque con el caldo definitivo, y rellenar con la cantidad de agua necesaria.
- No hacer particiones de la bolsa, usar el contenido del envase de una sola vez.
- Remover continuamente el caldo. El removedor tiene que estar funcionando en todo momento.
- Pulverizar inmediatamente.
- Quitar los filtros del pulverizador de malla inferior a 0,3mm (50 mesh) para evitar bloqueos.
- Diámetro de apertura de la boquilla, al menos 1/2 mm.
- Usar la menor presión posible (máx. 15-20bares).
- Riegue el cultivo antes y después de la aplicación.
- Mantenga el suelo/sustrato húmedo durante dos semanas después de la aplicación



- Conservar en lugar refrigerado entre 2°C - 6°C.
- Almacenar en oscuridad.
- Atienda a la fecha de caducidad de indicada en el paquete.

