

Ficha técnica de producto

Phytoseiulus Biosur

Phytoseiulus persimilis / Ácaro depredador

- Solo para el control de la araña roja
- Disminuye efectividad en condiciones extremadamente secas y cálidas
- Especialmente recomendado para eliminar altas densidades

Usar para

Plagas

Arañas rojas (*Tetranychus urticae*) y otras especies de *Tetranychus*, excepto *Tetranychus evansi*.

Cómo funciona

Modo de acción

Los ácaros depredadores perforan a sus presas con sus piezas bucales chupadoras y succionan el contenido.

Apariencia

Los estadios móviles son de color rojo anaranjado, redondos, con patas largas. Los adultos son aprox. 0,6 mm de

tamaño. Los huevos son rosados, ovalados y un poco más grandes que los huevos de araña roja.

Huevo de *Tetranychus urticae* (izquierda)

y *Phytoseiulus persimilis* (derecha)

Phytoseiulus persimilis ninfa *Phytoseiulus persimilis* adulto

Phytoseiulus persimilis depredando una
araña roja

Ficha técnica de producto

Especificaciones de producto

Tamaño del paquete

2.000; 10.000 ácaros depredadores.

Presentación

Botella de 100 ml con tapón dosificador, botella de 500 ml.

Etapa de desarrollo



Todos los estadios móviles.

Sustrato

Serrín.

Alimento

Ninguno.

Instrucciones de uso

Aplicación

- Girar y agitar el bote suavemente antes de usar
- Espolvorear material sobre hojas o verter en biobox . Asegúrese de que el material permanezca en el sitio de

introducción durante al menos unas horas después de la introducción

Ficha técnica de producto

La dosis depende del clima, el cultivo y la densidad de araña roja y siempre debe ajustarse a la situación particular.

Iniciar la introducción en cuanto se detecten los primeros ácaros de la plaga en el cultivo. Las tasas

de introducción suelen oscilar entre 2 y 50 por m²

/aplicación. Consulte a un asesor de Biosur o a un distribuidor

reconocido de productos Biosur para obtener asesoramiento sobre la mejor estrategia para su situación.

Condiciones ambientales

Phytoseiulus persimilis es más efectivo a temperaturas entre 13 y 27 °C y es sensible a la humedad relativa baja.

Uso combinado

Se puede combinar con Neoseiulus californicus y Feltiella acarisuga.

Efectos secundarios

Los plaguicidas pueden tener efectos (in)directos en las soluciones biológicas. Consultar con el equipo técnico de Biosur

Manejo del producto

Tiempo de almacenamiento después de la recepción

1-2 días.

BIOSUR



Temperatura de almacenamiento

8-10°C.

Almacenaje del producto

En la oscuridad, botella horizontalmente.

Notas

Phytoseiulus persimilis solo se alimenta de araña roja, preferiblemente de *Tetranychus* spp.

No puede sobrevivir con otras fuentes de alimento.

Declaración de responsabilidad

Se aplican las condiciones generales de BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS.

Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales. BIOSUR no se hace responsable del uso no autorizado. BIOSUR no es responsable de ninguna pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas

